



La leishmaniosis es una enfermedad provocada por la picadura de un mosquito (phlebotomus) que habita en la cuenca mediterránea, y es capaz de transmitir el parásito sanguíneo *Leishmania infantum*, causante de dicha enfermedad.

Los perros con más riesgo de contraer la enfermedad son aquellos que viven todo el tiempo en el jardín, y sobre todo aquellos que duermen fuera toda la noche, ya que el hábito del mosquito es picar al anochecer y al amanecer.

Los síntomas presentan una evolución lenta pero progresiva, con leve o nula respuesta a los tratamientos habituales (antibióticos, antiinflamatorios,...) y pueden aparecer uno o varios de los siguientes:

- Lesiones cutáneas, que comienzan por la cabeza y luego se extienden al resto del cuerpo. Suelen aparecer zonas sin pelo y con intensa caspa que pueden acabar ulcerándose.
- Crecimiento exagerado de las uñas.

- Pérdida de peso y apetito con atrofia de los músculos faciales.
- Hemorragias nasales.
- Heces pastosas, con posible presencia de sangre.
- Fallo renal que produce que el animal beba y orine más.
- Cojeras intermitentes.
- Lesiones oculares.
- Fiebre que no responde al tratamiento habitual.
- Aumento del tamaño de los ganglios.



~~Resistencia a la quimioterapia en perros con leishmaniasis. [picke and](#)~~